

SLEDAI 2K (Systemischer Lupus Erythematoses Disease Activity Index 2000)

Nach Bombardier C et al. Arthritis Rheum 1992;35:630–40

| Parameter/Definition | Punkte | Parameter/Definition | Punkte |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------|
| Krampfanfall | 8 | Komplementverminderung C3, C4 oder CH50 | 2 |
| Psychose | 8 | Erhöhte DNA-Antikörper | 2 |
| Hirnorganisches Psychosyndrom | 8 | Perikarditis | 2 |
| Sehstörungen | 8 | Erythem | 2 |
| Hirnnervenbeteiligung | 8 | Schleimhautulzera | 2 |
| Lupus-Kopfschmerz | 8 | Alopezie | 2 |
| Schlaganfall | 8 | Fieber >38°C | 1 |
| Vaskulitis | 8 | Thrombozytopenie < 100.000 / mm ³ | 1 |
| Arthritis (≥2 schmerzhafte Gelenke mit Entzündung z.B.: Schwellung, Erguss..) | 4 | Leukopenie | 1 |
| Myositis | 4 | | |
| Harnzylinder | 4 | | |
| Hämaturie (>5 Erythrozyten / high power field) | 4 | | |
| Proteinurie (>0,5 g / 24h) | 4 | | |
| Pyurie (>5 Leukozyten / high power field) | 4 | | |

Therapieziele

DORIS (Definition of Remission in SLE) [Nach van Vollenhoven RF et al. Lupus Sci Med. 2021;8:e000538]

- (1) SLEDAI=0, Arzt Globalurteil <0.5 (0-3)
- (2) Prednisolondosis ≤5 mg/Tag
- (3) stabile Therapie mit Antimalarika, Immunosuppressiva und Biologika

LLDAS (Low Lupus Disease Activity) [nach Franklyn K et al. Ann Rheum Dis 2016;75:1615-21]:

- (1) SLEDAI-2K ≤4, ohne Aktivität in majoren Organsystemen (renal, ZNS, Kardiopulmonarsystem, Vaskulitis, Fieber) und keine Hämolysen oder gastrointestinale Aktivität
- (2) keine neue Lupusaktivität im Vergleich zur Voruntersuchung
- (3) Arztglobalurteil ≤1 (scale 0-3)
- (4) Prednisondosisäquivalent ≤7.5 mg/Tag*
- (5) gut tolerierte Standarddosis von Immunosuppressiva und zugelassenen Biologika

*Als pädiatrische Maximaldosis wird zudem < 0,15 mg/kg gefordert