

# Juvenile Arthritis Disease Activity Score (JADAS)

Name, Vorname \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

## 1. globale Arzteinschätzung zur Krankheitsaktivität

keine 

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

 maximal

## 2. globale Patienten-/ Elterneinschätzung zur Krankheitsaktivität

keine 

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

 maximal

## 3. Anzahl aktiver Gelenke = Gelenke mit Schwellung oder Bewegungseinschränkung und Schmerz oder mit beidem\*

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	≥10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

## 4. Blutsenkungsgeschwindigkeit Wert in mm/h: ( \_\_\_\_\_ -20)/10= \_\_\_\_\_

Werte < 20 mm/h gehen mit 0, Werte > 120 mm/h mit 120 ein, maximal 10 Punkte)§

oder

## 4. C-reaktives Protein in mg/l: ...[(Messwert \_\_\_\_\_)/10, maximal 10 Punkte)§

\*bei JADAS71 werden alle aktiven Gelenke gezählt, Spannbreite JADAS71 = 0–101

bei JADAS10 werden maximal 10 aktive Gelenke gezählt, Spannbreite JADAS10 = 0–40

bei JADAS27 werden folgende aktiven Gelenke gezählt: Halswirbelsäule, beide Ellbogen-, Handgelenke, Metacarpophalangealgelenke (vom ersten bis zum dritten), proximale Interphalangealgelenke, Hüft-, Knie und Sprunggelenke, Spannbreite 0–57

§ der cJADAS wird ohne Laborwerte gebildet (z.B cJADAS10 Wert 0-30)

Interpretation:

Krankheitsaktivitätsstadium	Oligoarthritis		Polyarthritis	
	JADAS	cJADAS	JADAS	cJADAS
Inaktive Erkrankung	≤ 1,4	≤ 1,1	≤ 2,7	≤ 2,5
Minimale Krankheitsaktivität	1,5- ≤ 4	1,2- ≤ 4	2,8- ≤ 6	2,6- ≤ 5
Moderate Krankheitsaktivität	4,1- ≤ 13	4,1- ≤ 12	>6- ≤ 17	5,1 ≤ 16
Hohe Krankheitsaktivität	> 13	>12	>17	>16